

「県内ノリ生産者の皆様へ」

ノリ栄養塩情報第1号

令和8年(2026年)10月14日

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/257846.html>

長洲バイ水温	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13
10年平均値	24.6	24.5	24.3	24.2	24.0
R8年度	24.1	24.1	24.1	24.4	24.4

分析: 熊本県水産研究センター
協力: 熊本県漁業協同組合連合会
熊本県海苔養殖連絡協議会

海区	地区	区分	今回 ※満潮時刻(熊本) 11:47							参考:窒素量		備 考
			窒素量 μg・at/L	リン量 μg・at/L	水温 ℃	比重 (ρ 15)	珪藻類 cells/ml	採水		10年平均値※ (10月中旬)	R7年 (10/28)	
								月日	時刻			
有明海	荒 尾	支柱	7.9	0.3	25.0	23.2	1,100	10/14	9:30	10.4	4.2	
		ベタ	欠測	－	－	－	－		－	9.4	欠測	
	熊 本 北 部	支柱	5.3	0.1	24.7	23.1	2,500		9:40	10.1	4.4	
		ベタ	7.5	0.3	24.8	23.5	700		9:45	11.1	8.4	
	岱 明	支柱	0.5	0.1	25.1	22.8	4,500		10:10	7.9	5.5	
		ベタ	1.2	0.1	25.3	23.4	2,500		10:24	6.9	4.3	
	滑 石	支柱	欠測	－	－	－	－		－	17.9	5.1	
		ベタ	欠測	－	－	－	－		－	5.7	3.4	
	河 内	支柱	11.7	0.3	24.5	22.4	1,100		7:50	17.9	14.0	
		ベタ	6.6	0.2	24.4	23.1	1,600		7:55	8.2	5.3	
	松 尾	支柱	24.6	0.3	24.0	22.8	1,200		7:30	0.5	15.2	
		ベタ	18.1	0.3	24.0	22.6	570		7:30	0.7	8.1	
	沖 新	支柱	4.7	0.1	25.2	23.7	1,400		10:30	9.3	8.1	
		ベタ	3.1	0.1	25.6	23.7	1,400		10:00	6.4	11.6	
	畠 口	支柱	9.1	0.3	25.8	23.0	660		10:00	9.3	9.3	
		ベタ	8.7	0.2	26.0	23.2	810		10:30	9.9	12.4	
	網 田	支柱	0.7	0.0	25.9	23.8	2,700		9:45	5.0	23.3	
		ベタ	0.6	0.0	25.4	23.9	2,200		9:35	4.3	21.8	
	平均	支柱	8.1	0.2	25.0	23.1				9.8	8.2	
		ベタ	6.5	0.2	25.1	23.3				7.0	7.0	
		全体	7.4	0.2	25.0	23.2				8.4	7.7	
八代海	三 角	支柱	2.1	0.3	25.5	22.9	2,900	10/14	10:10	7.2	7.6	
	平均	全体	2.1	0.3	25.5	22.9				7.2	7.6	
熊本県	平均	支柱	7.4	0.2	25.1	23.1				9.5	8.2	
		ベタ	6.5	0.2	25.1	23.3				7.0	7.0	
		全体	7.0	0.2	25.1	23.2				8.3	7.7	

※期待値は、窒素量 7以上、リン量 0.5以上
※珪藻類：スケルトナ属、キートセロ属等

※10年平均値は平成28年度から令和7年度の旬別平均とする。
ただし、松尾と沖新は調査年が異なるため、松尾は平成26年度から平成29年度と令和6年度から令和7年度の6年平均、沖新は令和3年度から令和7年度の4年平均とする。
また、滑石は調査地点が大浜の調査地点に近接しているため大浜の10年平均とする。

